

## 二十二、十字花科蔬菜鱗翅目蝶蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時每7天施一次。	1.小葉菜類及包葉菜類採收前22天、根菜類採收前35天停止施藥。 2.毒性請參考農藥標示，避免於開花時使用。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	葉菜類採收前9天停止施藥，根菜類採收前14天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	葉菜類採收前9天停止施藥，根菜類採收前14天停止施藥。
34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.1-0.4 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、包葉菜類及根菜類採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、包葉菜類及根菜類採收前14天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、包葉菜類及根菜類採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、包葉菜類及根菜類採收前14天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-1.3 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、包葉菜類及根菜類採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑