

三十五、十字花科包葉菜類植食性瓢蟲類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
19.2g/L因滅汀 乳劑* (Emamectin benzoate)	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.15-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.08-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%因汀氟滅 水分散性粒劑* (Emamectin benzoate + Flubendiamide)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天再施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。

*延伸使用藥劑