

三十九、十字花科包葉菜類夜蛾類、紋白蝶、螟蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前12天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前12天停止施藥。
19.2g/L因滅汀 乳劑* (Emamectin benzoate)	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.15-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑