

## 四十、菊科作物夜蛾類、毒蛾類、植食性瓢蟲、金花蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公升	1,500	害蟲發生時每7天施一次。	1.小葉菜類採收前14天、 包葉菜類採收前22天、 根菜類採收前35天停止 施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於 開花時使用。
18.4%剋安勃 水懸劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.4 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類、 毒蛾類。 2.小葉菜類採收前9天、包 葉菜類採收前12天、根 菜類採收前14天停止施 藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類、 毒蛾類。 2.小葉菜類採收前9天、包 葉菜類採收前12天、根 菜類採收前14天停止施 藥。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前4天停止施藥。

\*延伸使用藥劑