

四十三、芥藍銀葉粉蝨【參照花椰菜銀葉粉蝨】

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%布芬淨 可濕性粉劑 (Buprofezin)	1-1.5 公斤	1,500	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	採收前6天停止施藥。
2%阿巴汀乳劑 (Abamectin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	採收前10天停止施藥。
2%阿巴汀水基乳劑 (Abamectin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	採收前10天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具輕度皮膚刺激性，對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
2.5%畢芬寧 水懸劑 (Bifenthrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具輕度皮膚刺激性，對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
50%培丹 水溶性粉劑 (Cartap hydrochloride)	1-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.6-0.8 公升	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，對水生物中等毒。
9.6%益達胺水懸劑 (Imidacloprid)	0.6-0.8 公升	1,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，對水生物中等毒。