

四十九、菊科作物夜蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、包葉菜類、根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-1.3 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、包葉菜類、根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、包葉菜類、根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、包葉菜類、根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類、包葉菜類、乾豆類採收前14天；根菜類採收前18天停止施藥。

*延伸使用藥劑