

五十三、菊科包葉菜類薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.1-0.3 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
10%賽滅寧可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧水基乳劑* (Cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

*延伸使用藥劑

