

五十五、菊科蔬菜薊馬類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (Lambda- cyhalothrin)	0.4-1.4 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (Lambda- cyhalothrin)	0.1-0.3 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (Lambda- cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (Lambda- cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著劑* (Lambda- cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (Lambda- cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑