

六十五、蔥科葉菜類蚜蟲類

蔥科葉菜類：包括蔥、蒜、韭等作物。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.8-2.0 公斤	1,000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
50%賽達松乳劑* (Phenthoate)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
1%密滅汀乳劑* (Milbemectin)	0.5-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.1-0.15公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
58%乃力松乳劑* (Naled)	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
50%培丹水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.9-1.2公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%第滅寧水基乳劑* (Deltamethrin)	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
20%免扶克乳劑* (Benfuracarb)	1-2公升	500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
31.6%護賽寧乳劑* (Flucythrinate)	0.1-0.2公升	8,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。

*延伸使用藥劑