

六十七、菊科包葉菜類蚜蟲類

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------|--|
| 21.8%速殺氟水懸劑* (Sulfoxaflor) | 0.04-0.17 公升 | 6,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂劇毒，避免於標的作物開花時期使用。 |
| 2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin) | 0.3-1.0 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin) | 0.3-1.0 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 2.8%第滅寧水基乳劑* (Deltamethrin) | 0.3-1.0 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl) | 0.2-0.7 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl) | 0.2-0.7 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl) | 0.2-0.7 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl) | 0.3-1.3 公斤 | 800 | 害蟲發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑