

## 六十九、菊科包葉菜類夜蛾類

| 藥劑名稱                                       | 每公頃每次施藥量      | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                      | 注意事項                                    |
|--|---------------|---------|---------------------------|---|
| 25%二福隆<br>可濕性粉劑*<br>(Diflubenzuron)        | 0.4-0.6<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時每7天施一次。              | 1.採收前22天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免於<br>開花時使用。 |
| 18.4%剋安勃<br>水懸劑*<br>(Chlorantraniliprole)  | 0.1-0.4<br>公升 | 2,500   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前12天停止施藥。                             |
| 35%剋安勃<br>水分散性粒劑*<br>(Chlorantraniliprole) | 0.1-0.2<br>公斤 | 5,000   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前12天停止施藥。                             |
| 58%乃力松乳劑*<br>(Naled)                       | 0.5-1<br>公斤   | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前4天停止施藥。                              |
| 10%賽滅寧<br>可濕性粉劑*<br>(Cypermethrin)         | 0.1-0.3<br>公斤 | 3,000   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免開<br>花時使用。   |
| 5%賽滅寧<br>可濕性粉劑*<br>(Cypermethrin)          | 0.2-0.7<br>公斤 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免開<br>花時使用。   |
| 5%賽滅寧<br>水基乳劑*<br>(Cypermethrin)           | 0.2-0.7<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免開<br>花時使用。   |
| 5%賽滅寧微乳劑*<br>(Cypermethrin)                | 0.2-0.7<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免開<br>花時使用。   |
| 5%賽滅寧乳劑*<br>(Cypermethrin)                 | 0.2-0.7<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免開<br>花時使用。   |

\*延伸使用藥劑