

一、白殭菌 A1

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
白殭菌 A1	<i>Beauveria bassiana</i> A1	Beauveria bassiana A1

3X10⁹ conidia/g 白殭菌 A1 XX

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期	注意事項	原始登記 廠商名稱
十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類、十字花科根菜類	小菜蛾	33 公斤	30	害蟲發生時開始施藥，均勻噴施於葉面及葉背，或澆灌於土壤，隔 7 天再施藥 1 次。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥前於田區先灑水，施藥後仍需維持環境濕度。 2. 選擇午後天氣陰涼時施藥。 3. 本藥劑試驗以 T500 作為展著劑。 4. 產品包裝型態為 3×10⁹ conidia/g 白殭菌 A1 網袋包 	沅漢生物科技股份有限公司

二、液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> YCMA1	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> YCMA1

5×10⁹ cfu/ml 以上 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
甘藍	黑斑病	1.3-2.6 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。		百泰生物 科技股份 有限公司
十字花科 小葉菜類	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
十字花科 包葉菜類	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
十字花科 根菜類	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
油菜	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。適 用於油菜籽。	延伸使用	
菊科包葉 菜類	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
菊科小葉 菜類	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
菊科根菜 類	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
向日葵	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
菊	黑斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
山蘇	葉斑病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
芹菜	黑葉枯病	0.4-5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
芫荽	黑葉枯病	0.4-5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
胡蘿蔔	黑葉枯病	0.4-5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
當歸	黑葉枯病	0.4-5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
蔥科小葉 菜類	紫斑病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
蔥科根菜 類	紫斑病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
豆菜類	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
豆科乾豆 類	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。	延伸使用	
豌豆	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施	延伸使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
				開始施藥					於植株全株。適用於葉用豌豆。		
黃耆	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆薯	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
狗尾草	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
闊葉大豆	葉枯病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆菜類	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆科乾豆類	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豌豆	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。適用於葉用豌豆。	延伸使用	
黃耆	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆薯	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
狗尾草	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
闊葉大豆	葉斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆菜類	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆科乾豆類	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豌豆	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。適用於葉用豌豆。	延伸使用	
黃耆	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
豆薯	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
狗尾草	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
闊葉大豆	褐斑病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
茄科果菜類	早疫病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
枸杞	早疫病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。適用於枸杞葉。	延伸使用	
馬鈴薯	早疫病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施	延伸使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
				開始施藥					於植株全株。		
茄科果菜類	輪紋病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
枸杞	輪紋病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。適用於枸杞葉。	延伸使用	
馬鈴薯	輪紋病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
地黃	葉斑病	0.4-1.3 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
當歸	葉枯病	0.4-1.3 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。	延伸使用	
花木	黑斑病	1.0-4.2 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	延伸使用	
花木	褐斑病	1.0-4.2 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施於植株全株。限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	延伸使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
花木	葉斑病	1.0-4.2 公斤	600	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3-4 次			藥液需均勻噴施 於植株全株。限 觀賞花卉使用， 使用前宜先進行 小面積藥害測 試。	延伸使用	