

# 輸日毛豆病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所  
(107.10.23 修訂)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑

※請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全 採收期(天)	備註
白粉病	枯草桿菌	免訂	免訂	-	
	碳酸氫鉀	免訂	免訂	-	
	礦物油	免訂	免訂	-	
	白克列	3	1	9	
	◎氟克殺 0.5	2 0.5	1.5 0.5	7	氟克殺 百克敏
灰黴病	白克列	3	1	9	
	◎氟克殺 0.5	2 0.5	1.5 0.5	7	氟克殺 百克敏
白絹病	福多寧	2	1	14	
炭疽病	百克敏	0.5	0.5	7	
	亞托敏	5	0.5	14	
疫病	鹼性氯氧化銅	免訂	免訂	-	
	亞托敏	5	0.5	14	
露菌病	松香酯銅	免訂		-	
	亞托敏	5	0.5	14	
黑斑病 銹病	◎白列克敏 0.5	3 0.5	1 0.5	9	白克列 百克敏
黑斑病	氟克殺	2	1.5	7	
葉枯病、葉斑 病、褐斑病	液化澱粉 芽孢桿菌	免訂	免訂		
蚜蟲類	福瑞松	0.2	0.05	-	
	第滅寧	0.5	0.2	7	
粉蟲類	可尼丁	2	0.1	6	
	益達胺	3	3	9	
	達特南	2	0.5	9	
	賽速安	0.3	0.02	6	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全 採收期(天)	備註
鱗翅目害蟲 (螟蛾類、夜蛾 類、毒蛾類等)	因得克	1	0.5	6	
	蘇力菌	免訂	免訂	-	
	因滅汀	0.1	0.02	3	
	芬化利	1	0.1	14	
	賽洛寧	1	1	3	
	賽滅寧	5	0.5	9	
	剋安勃	1	0.5	6	
	美氟綜	10	1	15	
	馬拉松	2	2	4	
	◎賽速安勃	0.3 1	0.02 0.5	6	賽速安 剋安勃
薊馬類	貝他-賽扶寧	2	0.5	9	
	賽洛寧	1	1	3	
	亞滅培	3	1	6	
	益達胺	3	3	9	
	賜諾殺	0.3	0.3	3	
	賜派滅	3	1.5	7	
葉蟎類	芬普蟎	2	2	14	
	畢達本	2	0.1	14	
潛蠅類	賽洛寧	1	1	3	
	可尼丁	2	0.1	-	
	福瑞松	0.2	0.05	-	

二、臺日雙方皆訂有殘留容許量，但日本標準較我國略嚴之藥劑：

※欲生產輸日毛豆者請謹慎使用，技術問題請洽轄區農業改良場

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全 採收期(天)	備註
鱗翅目害蟲 蚜蟲類、薊馬類	畢芬寧	0.6	1	3	
鱗翅目害蟲	硫敵克	0.5 (0.5)	1 (0.5)	14	代謝物 (納乃得)

三、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

※欲生產輸日毛豆者，後期應避免使用

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全 採收期(天)	備註
白絹病	撲滅寧	*	2	14	107年11月下修
幼苗疫病	依得利	0.1	0.5	-	
白粉病	三得芬	0.05	1	9	
	撲滅寧	*	2	14	107年11月下修
	平克座	0.05	0.5	6	
	待克利	*	1	3	
炭疽病	四氣異苯腈	2	5	6	
	待克利	*	1	3	
	◎亞托待克利	5 *	0.5 1	7	亞托敏 待克利
銹病	嘉保信	*	5	6	
莢枯病	三得芬	0.05	1	9	
葉燒病	維利黴素	0.05	免訂	-	
金花蟲類 植食性瓢蟲類	二福隆	0.05	1	21	
夜蛾類 毒蛾類	二福隆	0.05	1	21	
	乃力松	0.1	0.5	4	
	佈飛松	*	1	10	
	克凡派	5	未訂	18	
	陶斯松	0.3	未訂	16	
	賜諾特	0.5	0.05	7	
	◎佈飛百滅寧	* 3	1 1	10	佈飛松 百滅寧
粉蟲類	派滅淨	*	0.5	21	
潛蠅類	賽滅淨	*	1	7	
薊馬類	佈飛松	*	1	10	
	福化利	*	0.5	7	

※雜草用藥請謹慎使用，勿噴及作物

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
雜草	西殺草	10	10	-	
	快伏草	0.3	0.2	-	
	施得圃	0.2	0.1	-	
	莫多草	0.3	0.1	-	
	理有龍	0.2	未訂	-	
	亞喜芬	0.1	未訂	-	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
雜草	芬殺草	0.1	未訂	-	
	伏寄普	0.1	未訂	-	
	可滅蹤	0.05	未訂	-	
	拉草	0.02	未訂	-	
	必芬諾	*	未訂	-	
	比達寧	*	未訂	-	
	撻乃安	*	未訂	-	
	甲基合氣氟	*	未訂	-	
	復祿芬	*	未訂	-	
	◎本達亞喜芬	0.05 0.1	未訂	-	本達隆 亞喜芬
	◎佈殺丹	* 0.03	未訂	-	佈滅淨 殺丹

**附註：**

\*：代表日本統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

◎：混合劑

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以公告為準，相關資訊可參考下列網站：

- 1.日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考 [goo.gl/HM203v](http://goo.gl/HM203v)
- 2.我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 [goo.gl/RgtB4n](http://goo.gl/RgtB4n)
- 3.我國登記使用農藥請參考防檢局農藥資訊服務網 [goo.gl/cF8fR](http://goo.gl/cF8fR)

**修正版本說明：**

- 1、日本 106 年 10 月下修「佈飛松」容許量(0.05ppm)為統一基準。
- 2、台灣於 107 年 8 月起禁用「大克蟎」。日本 107 年 11 月下修「撲滅寧」容許量(1.0ppm)為統一基準。

病蟲害防治技術諮詢請洽轄區改良場  
殘留標準可洽動植物防疫檢疫局或農業藥物毒物試驗所