

一、 白列克收欣

27.300%白列克收欣 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
瓜果類	白粉病	0.675 公升	1,200	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3 次		6		原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司
瓜菜類	白粉病	0.675 公升	1,200	病害發生初期 開始施藥	7	連續 3 次		6		原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司

二、 依滅草

240 G/L (24% W/V)依滅草 SL

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
非耕作農地	雜草	1.5 公升	加水至 600 公升				將藥液均勻噴施於 10-20 公分高之雜 草植株上。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 不可噴及鄰近作物以免發生藥害。 2. 田區半衰期 25-142 天，土壤殘效 3 個月至 2 年。施用前宜考量後作種植時期及種類，以免發生藥害。 3. 防除對象：牛筋草、木虱草、馬唐、細葉水丁香。 	原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司

三、 阿巴汀

2.000%阿巴汀 EC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	2		12		延伸使用

2.000%阿巴汀 EW

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	2		12		延伸使用

四、 益斯普

100 G/L (10% W/V) 益斯普 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
柑桔類	蚜蟲類	2公升	2,000	害蟲發生時開始施藥	7	最多2次		21	避免於開花期使用	延伸使用

五、 氟派瑞

400 G/L (40% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.4公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000					施用前請保持土壤濕潤。	延伸使用

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
				公升藥液。						
胡瓜	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	延伸使用

500 G/L (50% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	延伸使用
胡瓜	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	延伸使用

六、 刪除菸草田間用藥

普通名稱	劑型	含量	作物/病蟲名稱
三氯松	SP	80.000	菸草夜蛾類 菸草菸草蛾 菸草鱗翅目害蟲
		95.000	菸草夜蛾類 菸草菸草蛾 菸草鱗翅目害蟲
大克爛	WP	50.000	菸草吊腐病
大芬淨	WP	50.000	菸草雜草
大芬滅	WP	50.000	菸草雜草
大滅松	EC	20.000	菸草桃蚜
		44.000	菸草桃蚜
比加普	WP	50.000	菸草桃蚜
比達寧	EC	36.500	菸草腋芽抑制
加保利	WP	50.000	菸草夜蛾類 菸草菸草蛾 菸草鱗翅目害蟲
		85.000	菸草夜蛾類 菸草菸草蛾 菸草鱗翅目害蟲
加保扶	GR	3.000	菸草根瘤線蟲
	SC	40.640	菸草夜蛾類 菸草桃蚜
		44.000	菸草夜蛾類 菸草桃蚜
平克座	EC	10.500	菸草白粉病
甲基多保淨	WP	70.000	菸草白星病
百滅寧	EC	10.000	菸草夜蛾類
	EW	10.000	菸草夜蛾類
	WP	10.000	菸草夜蛾類
克福隆	EC	5.000	菸草夜蛾類
免賴得	WP	50.000	菸草白星病
抑芽素 鉀鹽	SL	21.700	菸草腋芽抑制
抑芽素 膽鹼鹽	SL	58.000	菸草腋芽抑制
抑芽醇	EC	78.400	菸草腋芽抑制
貝芬替	WG	50.000	菸草白星病
	WP	50.000	菸草白星病

普通名稱	劑型	含量	作物/病蟲名稱
		60.000	菸草白星病
貝芬錳	WP	74.000	菸草白星病
依得利	WP	35.000	菸草猝倒病
依普同	WP	50.000	菸草赤星病
依瑞莫	SC	25.000	菸草白粉病
治芽素	EC	63.000	菸草腋芽抑制
		85.000	菸草腋芽抑制
治芽素 乙	EC	85.000	菸草腋芽抑制
治芽素 甲	EC	85.000	菸草腋芽抑制
芬化利	EC	20.000	菸草夜蛾類
			菸草菸草蛾
			菸草鱗翅目害蟲
	EW	20.000	菸草夜蛾類
			菸草菸草蛾
			菸草鱗翅目害蟲
芬滅松	GR	10.000	菸草根瘤線蟲
保粒黴素 乙	WP	2.000	菸草白星病
保粒黴素 甲	WP	10%(POLYOXIN-B 100,000AmBu/g)	菸草白星病
施得圃	EC	34.000	菸草雜草
			菸草腋芽抑制
倍尼芬	EC	19.400	菸草雜草
氧化亞銅	WP	56.000	菸草猝倒病
益收生長素	SL	39.500	菸草抑制徒長
納乃得	SG	40.000	菸草夜蛾類
			菸草桃蚜
			菸草菸草蛾
			菸草鱗翅目害蟲
	SP	25.000	菸草夜蛾類
			菸草桃蚜
			菸草菸草蛾
			菸草鱗翅目害蟲
		40.000	菸草夜蛾類
			菸草桃蚜
			菸草菸草蛾
			菸草鱗翅目害蟲
	SPSB	40.000	菸草夜蛾類
			菸草桃蚜
			菸草菸草蛾

普通名稱	劑型	含量	作物/病蟲名稱
			菸草鱗翅目害蟲
馬拉松	EC	50.000	菸草桃蚜
	EW	50.000	菸草桃蚜
氫氧化銅	WG	77.000	菸草猝倒病
	WP	77.000	菸草猝倒病
		83.000	菸草猝倒病
畢芬寧	EC	2.800	菸草夜蛾類 菸草鱗翅目害蟲 菸草薊馬類 菸草植食性瓢蟲類
	SC	2.500	菸草夜蛾類 菸草鱗翅目害蟲 菸草薊馬類 菸草植食性瓢蟲類
斯美地	SL	32.700	菸草雜草
普拔克	SL	66.500	菸草猝倒病
腐絕	WP	40.000	菸草白星病
撲克拉錳	WP	50.000	菸草白粉病
撲滅松	EC	20.000	菸草桃蚜
		50.000	菸草桃蚜
毆殺松	EC	25.000	菸草夜蛾類 菸草桃蚜
	SG	75.000	菸草夜蛾類 菸草桃蚜 菸草菸草蛾 菸草鱗翅目害蟲
	SP	75.000	菸草夜蛾類 菸草桃蚜 菸草菸草蛾 菸草鱗翅目害蟲
毆殺滅	GR	5.000	菸草根瘤線蟲
賽洛寧	WP	1.000	菸草夜蛾類
邁隆	GR	98.000	菸草雜草
	MG	96.500	菸草雜草
	WP	85.000	菸草雜草 菸草猝倒病
覆滅蟎	SP	20.000	菸草薊馬類
鹼性氯氧化銅	WP	70.000	菸草猝倒病

普通名稱	劑型	含量	作物/病蟲名稱
		75.000	菸草猝倒病
		85.000	菸草猝倒病

※為配合政府菸害防制與輔導菸農離菸政策，刪除菸草田間防治之使用方法與範圍。