

輸大陸甜柿病蟲草害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所
(109年6月20日修訂)



一、雙方皆訂有容許量且我國標準與大陸相等或較嚴之藥劑

※請遵守規定之安全採收期

防治對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
白粉病	可濕性硫黃	免訂	免訂		M2
	◎銅合硫磺	免訂 免訂	免訂 免訂	6	鹼性氯氧化銅 M1 硫磺 M2
蚜蟲類 薊馬類	亞滅培	2	1	6	4A
葉蟎類	芬普寧	5	0.5	21	3A

二、大陸未訂定殘留容許量之藥劑種類

※請特別注意安全採收期

防治對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
白粉病	布瑞莫	-	2	2	8
	溴克座	-	0.5	6	G1
	護汰芬	-	0.4	6	G1
	邁克尼	-	0.5	6	G1
	平克座	-	0.2	6	G1
	撲克拉	-	1	9	G1
	三泰芬	-	0.5	10	G1
	賽福座	-	1.0	12	G1
	滅芬農	-	1	14	U8
灰黴病	撲滅寧	-	0.5	21	2
	益發靈	-	5	9	M6
	◎賽普護汰寧	- -	1 1	 18	賽普洛 9 護汰寧 12
角斑病	百克敏	-	1	6	C3,11
	邁克尼	-	0.5	6	G1

防治對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
角斑病	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	-	0.5	9	M7
炭疽病	依普同	-	5	12	2
	亞托敏	-	1	9	C3,11
	克收欣	-	1	21	C3,11
	克收欣	-	1	6	C3,11
	百克敏	-	1	15	C3,11
	三氟敏	-	0.5	18	C3,11
	扶吉胺	-	0.5	9	C5
	待克利	-	1	21	G1
	撲克拉	-	1	9	G1
	得克利	-	1	21	G1
	免得爛	-	2.5	21	M3
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	-	0.5	12	M7
	◎白列克敏	- -	1 1	6	白克列 7 百克敏 C3,11
	◎賽普護汰寧	- -	1 1	18	賽普洛 9 護汰寧 12
	◎三氟派瑞	- -	0.5 0.5,	18	三氟敏 C3,11 氟派瑞
菌核病	賽普洛	-	1	6	9
黑星病	賽普洛	-	1	12	9
	克收欣	-	1	6	C3,11
	比多農	-	0.5	6	G1
	芬瑞莫	-	0.5	5	G1
	多寧	-	2		U12
黑斑病	依普同	-	5	6、9	2
	撲滅寧	-	0.5	6	2
輪紋病	腐絕	-	5	6	1
	芬瑞莫	-	0.5	6	G1
鱗翅目害蟲 (夜蛾類 毒蛾類 刺蛾類)	賜諾特	-	0.2	6	5
	二福隆	-	1	28	15
	得芬諾	-	0.5	21	18
	賽洛寧	-	0.4	6	3A
	第滅寧	-	0.2	9	3A
	益達胺	-	0.5	9	4A

防治對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
粉介殼蟲類	馬拉松	-	0.5	8	1B
	達特南	-	1	6	4A
	速殺氟	-	0.5	7	4C
	百利普芬	-	0.5	9	7C
蚜蟲類	畢芬寧	-	0.5	10	3A
	賽洛寧	-	0.4	6	3A
葉蟬類	亞滅寧	-	2	6	3A
	賽洛寧	-	0.4	6	3A
葉蟎類	密滅汀	-	0.2	6	6
	畢達本	-	0.5	6	21
	芬佈賜	-	2	10	12B
	芬殺蟎	-	0.5	9	21A
	畢芬寧	-	0.5	12	3A
薊馬類	賜諾特	-	0.2	7	5
	克凡派	-	0.5	15	13
	賜派滅	-	0.7	6	23
	亞滅寧	-	2	6	3A
	第滅寧	-	0.2	6	3A
	賽洛寧	-	0.4	6	3A
	可尼丁	-	1	9	4A
	達特南	-	1	9	4A
	益達胺	-	0.5	9	4A

三、大陸殘留容許量較我國嚴格者：

※輸大陸生產者請謹慎使用或避免生育後期使用

防治對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
薊馬類	丁基加保扶	(0.02)	0.5	15	1A (代謝物-加保扶)

附註：

◎：混合劑

※：二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，適用於免得爛、鋅錳乃浦、錳乃浦、甲基鋅乃浦、得恩地等之殘留總量

登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以公告為準，相關資訊可參考下列網站：

1. 大陸農藥殘留容許量請參考《食品中农药最大残留限量》GB2763-2019。
2. 我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 goo.gl/RgtB4n
3. 我國登記使用農藥請參考農藥資訊服務網 goo.gl/cF8fR 或植物保護資訊系統 goo.gl/djjoHd

修正說明：「固殺草」容許量參考 codex 為 0.1ppm，但應避免噴及作物。

病蟲害防治技術諮詢請洽 **轄區改良場**

殘留標準可洽 **動植物防疫檢疫局** 或 **農業藥物毒物試驗所**