

| 作用機制 | 藥劑名稱 | 白絹病 | 幼苗疫病 | 疫病 | 露菌病 | 白粉病 | 炭疽病 | 銹病 | 灰黴病 | 黑斑病 | 莢枯病 |
|---------|------------|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| C2 | 福多寧 | ◎ | | | | | | | | | |
| | 白克列 | | | | | ◎ | | ○ | ○ | | |
| | 嘉保信 | | | | | | | ◎ | | | |
| | 氟克殺 | | | | | | | | | ◎ | |
| C2 + C3 | 氟殺克敏 | | | | | ◎ | | ○ | ◎ | | |
| | 白列克敏 | | | | | ○ | ○ | ◎ | | | |
| C3 | 亞托敏 | | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | | | |
| | 百克敏 | | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | |
| C3 + G1 | 亞托待克利 | | | | | | ◎ | | | | |
| D1 | 派美尼 | | | | | | | | ◎ | | |
| D1 + E2 | 賽普護汰寧 | | | | | | ○ | | ◎ | | |
| E3 | 撲滅寧 | ◎ | | | | ◎ | | | ○ | | |
| F3 | 依得利 | | ◎ | ○ | | | | | | | |
| F6 | 枯草桿菌 Y1336 | | | | ○ | ◎ | | | | | |
| G1 | 平克座 | | | | | ◎ | | | | | |
| | 待克利 | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| G2 | 三得芬 | | | | | ◎ | | ○ | | | ◎ |
| M1 | 鹼性氫氧化銅 | | ○ | ◎ | | | | | | | |
| | 松香酯銅 | | | | ◎ | | | | | | |
| M5 | 四氯異苯腈 | | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ○ | | ○ | |
| NC | 碳酸氫鉀 | | | | | ◎ | | | | | |
| | 礦物油 | | | | | ◎ | | | | | |

◎ 代表已登記在該使用範圍。

○ 代表已在國內登記於防治其他作物上不同病害種類。

豆科豆菜類作物包括大豆（毛豆）、豌豆、菜豆、豇豆、萊豆、蠶豆、扁豆、翼豆等。